

科名 血液内科

対象疾患名 悪性リンパ腫

プロトコール名 R+HyperCVAD/MA course2 I-LV ver

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5
1	CV	側管	リツキシマブ	375mg/m ²		↓				
			生理食塩液	500mL						
2	CV	側管	グラニセトロンバック	1mg	30分かけて	↓	↓	↓		
3	CV	側管	メソトレキセート	200mg/m ²	2時間かけて	↓				
			5%ブドウ糖液	100mL	10時					
4	CV	側管	メソトレキセート	800mg/m ²	22時間かけて	↓				
			5%ブドウ糖液	500mL	12時					
5	CV	側管	ソル・コーテフ	100mg/body	30分かけて		↓	↓		
			5%ブドウ糖液	50mL	12時間毎					
6	CV	側管	キロサイド	3000mg/m ²	3時間かけて		↓	↓		
			5%ブドウ糖液	500mL	12時間毎					
					朝					
7	CV	側管	ソル・コーテフ	100mg/body	30分かけて	↓	↓			
			5%ブドウ糖液	50mL	12時間毎					
8	CV	側管	キロサイド	3000mg/m ²	3時間かけて	↓	↓			
			5%ブドウ糖液	500mL	12時間毎					
					夕					
9	CV	側管	レボホリナート	25mg	30分かけて		↓			
			5%ブドウ糖液	50mL	22時					
10	CV	側管	レボホリナート	6mg/m ²	30分かけて		↓	↓		
			5%ブドウ糖液	50mL	4時					
11	CV	側管	レボホリナート	6mg/m ²	30分かけて	↓	↓			
			5%ブドウ糖液	50mL	10時					
12	CV	側管	レボホリナート	6mg/m ²	30分かけて	↓	↓			
			5%ブドウ糖液	50mL	16時					
13	CV	側管	レボホリナート	6mg/m ²	30分かけて	↓				
			5%ブドウ糖液	50mL	22時					

1クール=4日間

～MEMO～

催吐リスク4(90%以上)

キロサイド1日2回投与

キロサイド投与中はフルメトロン点眼を行う

60歳以上はキロサイドを減量する

day1のリツキシマブは、後日投与でも可。オーダーは血内5を使用。