

対象疾患名

中枢神経原発悪性リンパ腫

プロトコール名

MPV I-Lv ver

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	…	14
1	点滴	側管	メイロン	250mL	リツキシマブ終了 後に開始 10mL/hr	↓										
2	ワンショット	側管	ダイアモックス	250mg												
			5%ブドウ糖液	20mL	22時	↓										
3	点滴	側管	レボホリナート	10.5mg	15分かけて			↓	↓							
			5%ブドウ糖液	50mL	4時											
4	ワンショット	側管	ダイアモックス	250mg					↓	↓	↓	↓				
			5%ブドウ糖液	20mL	9時											
5	点滴	側管	パロノセトロンバッグ デキサート	0.75mg 9.9mg	30分かけて	↓										
6	点滴	側管	メソトレキセート	3500mg/m ²	2時間かけて	↓										
			5%ブドウ糖液	500mL	10時											
7	点滴	側管	オンコビン	1.4mg/m ²	30分かけて	↓										
			5%ブドウ糖液	50mL												
8	点滴	側管	レボホリナート	10.5mg	15分かけて		↓	↓	↓							
			5%ブドウ糖液	50mL	10時											
9	点滴	側管	レボホリナート	10.5mg	15分かけて	↓	↓									
			5%ブドウ糖液	50mL	16時											
10	点滴	側管	メイロン	250mL	10mL/hr	↓	↓	↓								
11	ワンショット	側管	ダイアモックス	250mg		↓	↓	↓								
			5%ブドウ糖液	20mL	22時											
12	点滴	側管	レボホリナート	10.5mg	15分かけて	↓	↓									
			5%ブドウ糖液	50mL	22時											
内服		塩酸プロカルバジン	100mg/m ²	分2～分3 奇数サイクルのみ		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

1クール=14日間

～MEMO～

- ・催吐リスク90%以上
- ・day1に血内-5 リツキシマブを併用し、R-MPVとする。
- ・通常、5サイクル行う
- 〈メソトレキセート〉
 - ・メソトレキセートの排泄を促すため、メイロンとダイアモックスをメソトレキセート投与前日からレボホリナート救援投与終了まで投与する。
 - ・レボホリナートはメソトレキセート血中濃度0.1 μ mol/L未満となるまで継続する。
 - ・メソトレキセート投与開始後48時間、72時間の血中濃度測定を行い、48時間値<1 μ mol/L、72時間値<0.1 μ mol/Lを確認する。
 - ・尿pHチェック指示あるか確認。
- 〈オンコビン〉
 - ・オンコビンは最大投与量2mg
 - 〈塩酸プロカルバジン〉
 - ・塩酸プロカルバジンは奇数サイクルのみday2-8の7日間服用する。