

科名 血液内科 血内211

対象疾患名 FLT3陽性 急性骨髓性白血病

プロトコール名 HDAC+ヴァンフリタ

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	・	・	・	19
1	CV	側管	グラニセトロンバッグ ソルコーテフ	1mg 100mg	30分かけて	↓	↓	↓							
2	CV	側管	キロサイド 5%ブドウ糖	3000mg/m ² 500mL	3時間かけて 朝 12時間毎	↓	↓	↓							
3	CV	側管	ソルコーテフ 5%ブドウ糖	100mg 50mL	30分かけて	↓	↓	↓							
4	CV	側管	キロサイド 5%ブドウ糖	3000mg/m ² 500mL	3時間かけて 夕 12時間毎	↓	↓	↓							
5	内服		ヴァンフリタ	35.4mg	1日1回							↓	↓	↓	↓

★1クール=28日間

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

最大4サイクル。

・キロサイド

キロサイド1日2回投与。

フルメトロン点眼併用。

60歳未満は3.0g/m²を12時間ごと。60歳以上は1.5g/m²を12時間ごと。

・ヴァンフリタ

6-19日目の14日間併用。

定期的な心電図検査。

強いCYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、クラリスロマイシン、ボリコナゾール等)と併用する場合、17.7mg/日へ減量。