

科名 血液内科 血内218

対象疾患名 再発又は難治性の末梢性T細胞性リンパ腫
再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫

プロトコール名 レミトロ

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	21
1	末梢	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ	↓	↓	↓	↓	↓			
2	末梢	側管	生理食塩液	250mL	レミトロ開始までに 投与終了	↓	↓	↓	↓	↓			
3	末梢	側管	ポララミン デキサート グラニセトロン	5mg 6.6mg 1mg	30分かけて 本剤投与前約120 分以内に投与 経口薬は投与前 約30-60分	↓	↓	↓	↓	↓			
4	末梢	側管	レミトロ 生理食塩液	9 μ /kg 50mL	1時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓			
5	末梢	側管	生理食塩液	250mL	入れきり終了	↓	↓	↓	↓	↓			

★1クール=21日間

～MEMO～

最大8サイクル。

催吐リスク:最小度リスク(10%以下)

<infusion reaction 対策>

本剤投与前約120分以内に以下の前投与を実施する。ただし、経口薬については投与前約30-60分の間を目処に投与する。

- ・アセトアミノフェン500mgを経口投与する。
- ・ポララミン5mgを静脈内投与する。
- ・デキサメタゾン4-8mgを静脈内投与する。
- ・各実施施設の使用状況に基づいた制吐剤を投与する。

<毛細血管漏出症候群対策>

本剤投与の前及び後に生理食塩液250-500mL(もしくは医師が適切と判断した輸液製剤)による輸液を行う。