

科名 脳外科
 対象疾患名 悪性神経膠腫
 プロトコール名 BEV+TMZ+RT

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	15	...	29	...	42	43	...	57	...	70	
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ													
2	点滴注	側管	アバスチン 生食	10mg/kg 100mL	医師の指示通り													
3	内服		テモダール	75mg/m ²	1日1回空腹時	—————>												

1クール = 70日

~ MEMO ~

催吐レベル2(10%以上30%未満)

放射線療法(2Gyを週5日間6週間、総線量60Gy)と併用

終了後、脳外7(2)BEV+TMZ、脳外7(3)BEVへ続く。

<アバスチン>

アバスチンは初回90分で点滴静注、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分で

行ってもよい。2回目の忍容性も良好であれば、以降30分投与もできる。

投与期間中は投与回数が増えるほど高血圧の出現頻度が高くなるため定期的に血圧を測定すること。

<テモダール>

1回75mg/m²を1日1回連日42日間経口投与し、4週間休薬する。

・本剤の投与開始にあたっては次の条件をすべて満たすこと。

好中球数の最低値が1,500/mm²以上

血小板数の最低値が100,000/mm²以上