

科名 脳外科  
 対象疾患名 悪性神経膠腫  
 プロトコール名 BEV+TMZ

| Rp | 形態  | ルート | 薬品名         | 投与量                  | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 15 | ... | 28 |
|----|-----|-----|-------------|----------------------|---------|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|
| 1  | 点滴注 | メイン | 生食          | 250mL                | ルートキープ  | ↓ |   |   |   |   |     |    | ↓   |    |
| 2  | 点滴注 | 側管  | アバステン<br>生食 | 10mg/kg<br>100mL     | 医師の指示通り | ↓ |   |   |   |   |     |    | ↓   |    |
| 3  | 内服  |     | テモダール       | 150mg/m <sup>2</sup> | 1日1回空腹時 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |     |    |     |    |

★1クール=28日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

初発の場合、6コース終了後、脳外7(3)Triweekly BEVへ続く。

再発の場合、28日を1クールとし、病勢が進行するまで繰り返す。

<アバステン>

アバステンは初回90分で点滴静注、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分で行ってもよい。2回目の忍容性も良好であれば、以降30分投与もできる。

投与期間中は投与回数が増えるほど高血圧の出現頻度が高くなるため定期的に血圧を測定すること。

大きな手術(開腹手術等)後28日以内には投与しないこと。

<テモダール>

テモダール単剤にて1回150mg/m<sup>2</sup>を1日1回5日間経口投与し、23日間休薬。

・本剤の投与開始条件

- ① 好中球数の最低値が1,500/mm<sup>2</sup>以上
- ② 血小板数の最低値が100,000/mm<sup>2</sup>以上

・次クールの投与量を200mg/m<sup>2</sup>/日に増量することができる。