

科名 脳外科 脳外-9
 対象疾患名 悪性神経膠腫
 プロトコール名 TMZ+RT(初発)

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 42 | 43 | ... | 70 |
|----|-----|-----|----------------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | 生食 | 250mL | ルートキープ 残破棄可 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | グラニセトロンバッグ | 1mg | 30分かけて | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | テモダール注 注射用水 生食 | 75mg/m ² 1Vあたり41mL 250mL | 注射用水で溶解 必ず90分で | → | | | | | | | | | | | |

★1クール=70日

～ MEMO ～

- ・催吐レベル3(30～90%)
- ・42日間連日投与、28日間休薬
- ・本剤の投与開始にあたっては次の条件をすべて満たすこと。
 - ① 好中球数の最低値が1,500/mm²以上
 - ② 血小板数の最低値が100,000/mm²以上
- ・調製方法
 - ① 1バイアルあたり41mLの注射用水で溶解すると2.5mg/mLとなる。
 - ② 患者の体表面積から換算した投与量を生食で希釈し、最終投与量を250mLに調製する。
 - ③ 調製後は、原則14時間以内に投与を終了すること