

科名 婦人科-1
 対象疾患名 卵巣癌・子宮体癌
 プロトコール名 TC療法(triweekly)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ	↓		
2	点滴注	側管	ファモチジン注 デキサート注 グラニセトロンバッグ 又は 点滴注 側管 パロノセトロンバッグ デキサート注 ファモチジン注	20mg 3.3~19.8mg 1mg 0.75mg 3.3~19.8mg 20mg	30分かけて 30分かけて	↓ ↓		
3	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓		
4	点滴注	側管	パクリタキセル 生理食塩液	180mg/m ² 500mL	必ず3時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	↓		
5	点滴注	側管	カルボプラチン 生理食塩液	AUC5~7.5 250mL	1時間以上かけて	↓		

★1クール=21日

~MEMO~

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデキサメタゾン錠を 朝、昼食後に 4mg/回 内服するか確認

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

末梢静脈から投与する場合は薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5~7.5=5~7.5x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降