

科名 婦人科 婦人7  
 対象疾患名 子宮頸がん、卵巣がん、小細胞がん  
 プロトコール名 CPT-11+CDDP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	～0:00	↓									
2	点滴注	側管	グラニセトンバッグ	1mg	30分かけて	↓									
			アロカリス	235mg											
	点滴注	側管	デキサート	9.9mg											
			又は												
	点滴注	側管	パロノセトンバッグ	0.75mg	30分かけて										
			アロカリス	235mg											
	点滴注	側管	デキサート	9.9mg											
3	点滴注	側管	カンプト	60mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて	↓									
			生理食塩液	500mL											
4	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	1時間かけて	↓									
5	点滴注	側管	ラシックス	10mg	シスプラチン投与前	↓									
6	点滴注	側管	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて	↓									
			生理食塩液	500mL											
7	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	～0:00	↓									
8	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	2時間かけて	↓									
9	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	Rp8終了～0:00	↓									
10	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00～6:00		↓								
11	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00～12:00			↓							
12	点滴注	側管	デキサート	6.6mg	9:00～			↓							
			生理食塩液	50mL	30分かけて										
13	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	12:00～18:00			↓							
14	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	18:00～0:00			↓							
15	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00～6:00				↓						
16	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00～14:00				↓						
17	点滴注	側管	デキサート	6.6mg	9:00～			↓							
			生理食塩液	50mL	30分かけて										
18	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	14:00～22:00				↓						
19	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	22:00～6:00				↓						
20	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00～					↓					
21	点滴注	側管	デキサート	6.6mg	9:00～			↓							
			生理食塩液	50mL	30分かけて										
22	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ							↓		↓	
23	点滴注	側管	グラニセトンバッグ	3mg	30分かけて										
			デキサート	9.9mg											
	点滴注	側管	アロキシバッグ	0.75mg	30分かけて										
			デキサート	9.9mg											
24	点滴注	側管	カンプト	60mg/m <sup>2</sup>	2時間かけて										
			生理食塩液	500mL											

★1クール＝28日

～MEMO～

day1は催吐レベル4(90%以上)、day8,15は催吐レベル3(90～30%以上)

day1はCPT-11+CDDP、day8,15はCPT-11のみ

投与中から24時間以内のコロナ様症状(下痢、腹痛、発汗、鼻汁など)出現時は抗コロナ剤(ブスコパンなど)投与を考慮

遅発期の下痢に関しては半夏瀉心湯やロペミン内服を考慮。

下痢時ロペミン1カプセル内服。効かなければ3時間ごとに8カプセルまで