

科名 婦人科-11

対象疾患名 進行・再発卵巣癌

プロトコール名 PTX(weekly)+CBDCA(A)

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | コメント | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 28 |
|----|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----|---|-----|----|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | 生理食塩液 | 250mL | ルートキープ | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | デキサート注 ファモチジン グラニセロンパック | 3.3~6.6~19.8mg 20mg 1mg | 30分かけて | ↓ | | | | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | デキサート注 ファモチジン 生理食塩液 | 3.3~6.6~19.8mg 20mg 50mL | 30分かけて | | | ↓ | | ↓ | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | ネオレスタール 生理食塩液 | 10mg 50mL | 30分かけて | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| 4 | 点滴注 | 側管 | パクリタキセル (タキソール) 生食 | 60~80mg/m ² 250mL | 1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| 5 | 点滴注 | 側管 | カルボプラチン注 生食 | AUC5~6 250mL | 30分かけて | ↓ | | | | | | |

★1クール=28日

~MEMO~

- ・ AUC5~6= 5 X (25+GFR) ~ 6 X (25+GFR)
- ・ パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認をする。
- ・ パクリタキセルのルートは、PVCフリーかつフィルター付きのものを使用
- ・ アレルギー対策として初回はデキサート増量
- ・ 終了後1時間の経過観察

進行・再発卵巣癌に対するweeklyTAXOL/CBDCA
の臨床第Ⅱ相試験;勝俣他、日本婦人科悪性腫瘍化学療法学会第13回学術集会記録
卵巣癌治療ガイドライン、日本婦人科腫瘍学会編