

科名 婦人科-12(b)
 対象疾患名 進行・再発卵巣癌
 プロトコール名 PTX(weekly)+CBDCA(2週目)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	コメント	1 ... 7
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓
2	点滴注	側管	デキサート注 ファモチジン グラニセトロン	3.3mg 20mg 3mg	30分かけて	↓
3	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓
4	点滴注	側管	パクリタキセル注 生食	60mg/m ² 250mL	1時間かけて	↓
5	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC1.5~2 250mL	30分かけて	↓

★1クール=7日

～MEMO～

- ・コース開始基準は、好中球数1000/mm³以上、血小板数7.5万/mm³以上
 2週目、3週目投与基準は、好中球数500/mm³以上、血小板数5万/mm³以上)
- ・ AUC1.5~2 = 1.5 X (25+GFR) ~ 2 X (25+GFR)
- ・ パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認をする。
- ・ パクリタキセルのルートは、PVCフリーかつフィルター付きのものを使用
- ・ 終了後1時間の経過観察