

科名 婦人科-12  
 対象疾患名 進行・再発卵巣癌  
 プロトコール名 PTX(weekly)+CBDCA(B)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	コメント	1	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	デキサート注 ファモチジン グラニセロンパック	6.6mg 20mg 1mg	30分かけて			↓		↓		↓
3	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		
4	点滴注	側管	パクリタキセル注(タキソール) 生食	60~80mg/m <sup>2</sup> 250mL	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	↓		↓		↓		
5	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC1.5~2 250mL	30分かけて	↓		↓		↓		

★1クール=28日(3投1休)

~MEMO~

- ・ AUC1.5~2= 1.5 X (25+GFR) ~ 2 X (25+GFR)
- ・ パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認をする。
- ・ パクリタキセルのルートは、PVCフリーかつフィルター付きのものを使用
- ・ アレルギー対策として初回はデキサート増量
- ・ 終了後1時間の経過観察