

科名 婦人科 婦-15

対象疾患名 卵巣癌

プロトコール名 Weekly PTX(1, 8, 15, 22, 29, 36)6投2休

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	コメント	1	8	#	22	29	36	43	50	56
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
2	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	30分かけて									
			ファモチジン注	20mg		↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			生理食塩液	50mL										
3	点滴注	側管	ネオレストール注	10mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			生理食塩液	50mL										
4	点滴注	側管	パクリタキセル注 (タキソール)	60~80mg/m ²	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん 剤	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			5%ブドウ糖液	250mL										

★1クール=56日(6投2休)

~MEMO~

- ・ パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認をする。
- ・ パクリタキセルのルートは、PVCフリーかつフィルター付きのものを使用
- ・ アレルギー対策として初回はデキサート増量
- ・ 終了後1時間の経過観察