

科名 婦人科
 対象疾患名 子宮体癌・卵巣癌
 プロトコール名 DP療法

婦人-18(b)

婦人科18(b)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	～17:00	↓					
2	点滴注	側管	グラニセトンパッグ アロカリス デキサート注 又は 点滴注 側管	1mg 235mg 9.9mg 0.75mg 235mg 9.9mg	30分かけて 30分かけて	↓					
3	点滴注	側管	生理食塩液	50mL	30分かけて	↓					
4	点滴注	側管	ドセタキセル 生理食塩液	70,60,50mg/m ² 500mL	90分かけて 壊死性抗癌剤	↓					
5	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	1時間かけて	↓					
6	点滴注	側管	ラシックス	10mg	シスプラチン投与前	↓					
7	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	60,50,40mg/m ² 500mL	2時間かけて	↓					
8	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	2時間かけて	↓					
9	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	17:00～0:00	↓					
10	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	Rp9終了～0:00まで	↓					
11	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00～6:00		↓				
12	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00～12:00		↓				
13	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00～ 30分かけて			↓			
14	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	12:00～18:00			↓			
15	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	18:00～0:00			↓			
16	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00～6:00				↓		
17	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00～14:00				↓		
18	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00～ 30分かけて				↓		
19	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	14:00～22:00				↓		
20	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	22:00～6:00				↓		
21	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00～					↓	
22	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00～ 30分かけて					↓	

★1クール=21日

～MEMO～

- ・ドセタキセル(DOC)70mg/m²+シスプラチン(CDDP)60mg/m²・・・triweekly～monthlyにて6コース
- ・クレアチニンクリアランス50mL/min以上
- ・血液毒性を認める場合はDOCのみ70→60→50mg/m²と減量する。
- ・血清Crが1.2mg/dLを超える場合はCcrを測定し、50mL/min未満ではCDDPを60→50→40mg/m²と減量する。
- ・grade3以上の非血液毒性deは、DOC, CDDPとも減量を検討する。

<ドセタキセル>

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。