

科名
対象疾患名
プロトコール名

婦人科
子宮体癌
CAP療法

婦人-21(b)

婦人21(b)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	~0:00	↓					
2	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	~0:00	↓					
3	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	90分かけて	↓					
4	点滴注	側管	グラニセトンバッグ アロカリス デキサート注 又は 点滴注 パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート注	1mg 235mg 9.9mg 0.75mg 235mg 9.9mg	30分かけて 30分かけて	↓					
5	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	1時間かけて	↓					
6	点滴注	側管	ラシックス	10mg	シスプラチン投与前	↓					
7	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	50,40,30mg/m ² 500mL	2時間かけて	↓					
8	点滴注	側管	ドキシソルビシン注 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	10分以内に 壊死性抗癌剤	↓					
9	点滴注	側管	エンドキサン注 生理食塩液	333mg/m ² 100mL	全開投与	↓					
10	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	2時間かけて	↓					
11	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	Rp10終了~0:00	↓					
12	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00~6:00		↓				
13	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00~12:00		↓				
14	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00~ 30分かけて		↓				
15	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	12:00~18:00		↓				
16	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	18:00~0:00		↓				
17	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00~6:00			↓			
18	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00~14:00			↓			
19	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00~ 30分かけて				↓		
20	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	14:00~22:00				↓		
21	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	22:00~6:00				↓		
22	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00~					↓	
23	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00~ 30分かけて						↓

★1コース=28日

~MEMO~

- ・CPA333mg/m²+ADR40mg/m²+CDDP50mg/m²...monthlyにて6コース
- ・Ccr50mL/min以上
- ・血液毒性を認める場合はCPAを333→250→166mg/m²、CDDPを50→40→30mg/m²と減量する。
- ・血清Crが1.2mg/dLを超える場合はCcrを測定し、50mL/min未満ではCDDPを50→40→30mg/m²と1レベルずつ減量する。
- ・grade3以上の非血液毒性では、CPA、CDDPとも減量を検討する。
- ・心臓一般所見の以上を認め、LVEFが50%を下回る場合あるいは治療開始前から20%以上減少している場合はADMを中止する。