

科名 婦人科 婦人-22(b)
 対象疾患名 子宮頸癌
 プロトコール名 TP療法(24hrPTX)アロキシ+プロイメント併用

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	~17:00	↓					
2	点滴注	側管	生理食塩液 デキサート注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 20mg	30分かけて	↓					
3	点滴注	側管	ネオレスタール 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓					
4	点滴注	側管	パクリタキセル注 (タキソール) 生理食塩液	67.5,55,45mg/m ² 500mL	12時間かけて 専用ルート 壊死性抗癌剤	↓					
5	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	17:00~0:00	↓					
6	点滴注	側管	パクリタキセル注 (タキソール) 生理食塩液	67.5,55,45mg/m ² 500mL	12時間かけて 専用ルート 壊死性抗癌剤	↓					
7	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	0:00~12:00		↓				
8	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	1時間かけて		↓				
9	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	12:00~0:00		↓				
10	点滴注	側管	プロイメント 生理食塩液	150mg 100mL	30分かけて		↓				
11	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注	0.75mg 9.9mg	30分かけて		↓				
12	点滴注	側管	ラシックス	10mg	シスプラチン投与前		↓				
13	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	50,37.5,25mg/m ² 500mL	2時間かけて		↓				
14	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	~0:00		↓				
15	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00~6:00			↓			
16	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00~12:00			↓			
17	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00~ 30分かけて			↓			
18	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	12:00~18:00			↓			
19	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	18:00~0:00			↓			
20	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00~6:00				↓		
21	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00~14:00				↓		
22	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00~ 30分かけて				↓		
23	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	14:00~22:00				↓		
24	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	22:00~6:00				↓		
25	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00~					↓	
26	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00~ 30分かけて					↓	

★1コース=21日

~MEMO~

- ・PTX135mg/m²+CDDP50mg/m²...triweeklyにて3~6コース
- ・Ccr50mL/min以上(50mL/min未満ではCcrにあわせてCDDPを1-2レベル減量して開始。
Cr>2.0投与不可)
- ・血液毒性(Gr3-4発熱性好中球減少症、Gr4血小板減少症)で減量を要する場合、PTXを1レベルずつ減量する。
- ・日常生活を害する末梢神経障害が出現した場合、PTXおよびCDDPを減量する。
- ・肝機能障害の場合、PTXを減量する。
- ・パクリタキセル(タキソール)は専用ルート(JY-PF340P52 フィルター付PVCフリー回路)を使用すること