

科名 婦人科 婦-27  
 対象疾患名 再発卵巣癌  
 プロトコール名 ノギテカン単剤

| Rp | 形態  | ルート | 薬剤名             | 投与量                                     | 時刻・コメント                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… | 21 |
|----|-----|-----|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| 1  | 点滴注 | メイン | 生理食塩液           | 250mL                                   | ルートキープ<br>ハイカムチン投与<br>終了後に抜去。<br>残破棄可 |   |   |   |   |   |    |    |
| 2  | 点滴注 | 側管  | グラニセロンバッグ       | 3mg                                     | 30分かけて                                |   |   |   |   |   |    |    |
| 3  | 点滴注 | 側管  | 生理食塩液<br>ハイカムチン | 100mL<br>0.5, 1.0, 1.2mg/m <sup>2</sup> | 30分かけて                                |   |   |   |   |   |    |    |

1クール = 21日

~ MEMO ~

- ・催吐レベル2 (10% ~ 30%)
- ・全身状態が良好で、卵巣癌の初回化学療法(プラチナベース)後の再発患者に対して投与を行う。
- ・重度の血液毒性所見が現れることがあるので、投与後、血液学的検査値の変動に充分注意し、次コースの投与量は患者の状態により適宜減量すること。
- ・ハイカムチンは、腎障害により投与量を変更する。  
 CCr 60ml/min 1.2mg/m<sup>2</sup>  
 40 CCr < 60ml/min 1.0mg/m<sup>2</sup>  
 20 CCr < 40ml/min 0.5mg/m<sup>2</sup>  
 CCr 20ml/min 投与を中止する。
- ・± 5Kgを超える体重変動があった場合は、再度体表面積を計算して投与量を決定する。