

科名 婦人科 婦人科-30(c)
 対象疾患名 卵巣がん
 プロトコール名 dose-denseTC(ステロイド漸減レベル1でもアレルギー反応なし、ステロイド漸減レベル2)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	.. 8	... 15	.. 21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	↓	
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓			
			デキサート注	1.65mg					
	点滴注	側管	ファモチジン注	20mg	30分かけて	↓			
			又は パロノセトロンバッグ	0.75mg					
2'	点滴注	側管	デキサート注	1.65mg	30分かけて		↓	↓	
			ファモチジン注	20mg					
3	点滴注	側管	ネオレスタール注	10mg	30分かけて	↓	↓	↓	
			生理食塩液	50mL					
4	点滴注	側管	パクリタキセル注	80、70、60mg/m ²	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	↓	↓	↓	
			生理食塩液	250mL					
5	点滴注	側管	カルボプラチン注	AUC 6、5、4	1時間かけて	↓			
			生理食塩液	250mL					

★1クール=21日、6クール

~MEMO~

- ・ 卵巣癌術後補助療法、術前化学療法、再発時化学療法として使用。
 (PTX240mg/m²+CBDCA AUC6/1コース)
- ・ 21日を1クールとして、次クール開始基準を満たしていれば、休薬なしで次クールに入ることができる。
- ・ 次コース開始基準は、好中球数1000/mm³以上、血小板数7.5万/mm³以上
 (day8、15投与基準は、好中球数500/mm³以上、血小板数5万/mm³以上)
- ・ AUC=6~4 × (25+GFR)
- ・ パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認をする。
- ・ パクリタキセルのルートは、PVCフリーかつフィルター付きのものを使用