

科名 婦人科

婦人-32

対象疾患名 卵巣腫瘍(胚細胞性腫瘍)

プロトコール名 BEP療法(イメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	~0:00	↓	↓	↓	↓	↓						
2	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	9:00~ 1時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓						
3	点滴注	側管	グラニセトロン アロカリス デキサート注	1mg 235mg 9.9mg	10:00~ 30分かけて	↓										
4	点滴注	側管	デキサート注 グラニセトロン	6.6mg 1mg	10:00~ 30分かけて		↓	↓	↓	↓						
5	点滴注	側管	ブレオ 生理食塩液	30mg/body 50mL	10:30 30分かけて	↓										
6	点滴注	側管	エトポシド注 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	11:00~ 1時間かけて	↓										
7	点滴注	側管	エトポシド注 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	10:30~ 1時間かけて		↓	↓	↓	↓						
8	点滴注	側管	ラシックス	10mg	シスプラチン投与前	↓	↓	↓	↓	↓						
9	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	12:00~15:00 3時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓						
10	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	15:00~17:00	↓	↓	↓	↓	↓						
11	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	17:00~19:00	↓	↓	↓	↓	↓						
12	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	19:00~21:00	↓	↓	↓	↓	↓						
13	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ							↓				↓
14	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	1時間かけて							↓				↓
15	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	30分かけて							↓				↓
16	点滴注	側管	ブレオ 生理食塩液	30mg/body 50mL	30分かけて							↓				↓
17	点滴注	側管	ソリアセトF	500mL	3時間かけて							↓				↓

★1クール=21日

~MEMO~

- ・ 1クール21日、計3~4クール行なう。
- ・ 胚細胞性腫瘍は、BEP療法にて根治的治療可能なため、予防的G-CSF使用が認められる。
- ・ 投与スケジュールを守るようにG-CSFにてコントロールする。
- ・ 間質性肺炎に注意し、毎クール C-Xp、BGAチェックを行なう。
- ・ ブレオ投与後には発熱する。(アセトアミノフェンなどの処方考慮する。)
- ・ ブレオの1回の投与量は、MAX=30mgまで、総投与量は360mg以下とする。