

科名 婦人科 婦33(a)
 対象疾患名 子宮頸がん(扁平上皮癌)
 プロトコール名 【臨床試験 KCOG-G1101】PTX+NDP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ... 8 ... 15 ... 28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ	↓
2	点滴注	側管	グラニセトロン3mgバッグ	3mg	30分かけて	↓
			デキサート	19.8mg		
	点滴注	側管	ファモチジン	20mg	30分かけて	
			又は			
	点滴注	側管	アロキシバッグ	0.75mg	30分かけて	
			デキサート	19.8mg		
	点滴注	側管	ファモチジン	20mg		
3	点滴注	側管	ネオレスタール	10mg	30分かけて	↓
			生理食塩液	50mL		
4	点滴注	側管	パクリタキセル	175/150/135/110 mg/m ²	3時間かけて	↓
			生理食塩液	500mL	※専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	
5	点滴注	側管	アクプラ	80/70/60/50 mg/m ²	90分かけて	↓
			生理食塩液	500mL		
6	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	1時間かけて	↓
7	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	1時間かけて	↓

★1クール=28日

～MEMO～

day2～3にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認を。

パクリタキセルはPVCフリーかつフィルター付きのもの(回路名: JY-PF340P52)を使用。

パクリタキセル投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.6倍にすること。

(1hrで滴下する場合136滴/分)

KCOG-G1101として施行時は同試験のeligibility criterialに準ずること。

KCOG臨床試験では体表面積はDuBoisの式で算出すること。

PTX 175mg/m²,day1(3h div)+NDP 80mg/m²,(1-2h div)を4週1クールとして5クール

次クール投与基準はNeut 1500以上,Plt7.5万以上,Cr1.5mg/mL以下