

科名 婦人科

対象疾患名 卵巣がん

プロトコール名 DC(アロカリス併用)

| Rp | 形態  | ルート | 薬品名             | 投与量                     | 時刻・コメント        | 1 ... 8 ... 15 ... 21 |
|----|-----|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | 点滴注 | メイン | 生食              | 500mL                   | ルートキープ<br>残破棄可 | ↓                     |
| 2  | 点滴注 | 側管  | グラニセトンバッグ       | 1mg                     | 30分かけて         | ↓                     |
|    |     |     | アロカリス           | 235mg                   |                |                       |
|    | 点滴注 | 側管  | デキサート           | 4.95mg                  | 30分かけて         |                       |
|    |     |     | 又は<br>パロノセトンバッグ | 0.75mg                  |                |                       |
| 3  | 点滴注 | 側管  | ネオレスタール         | 10mg                    | 30分かけて         | ↓                     |
|    |     |     | 生食              | 50mL                    |                |                       |
| 4  | 点滴注 | 側管  | ドセタキセル          | 75又は60mg/m <sup>2</sup> | 60分かけて         | ↓                     |
|    |     |     | 生食              | 250mL                   |                |                       |
| 5  | 点滴注 | 側管  | カルボプラチン         | AUC5又は4又は3              | 60分かけて         | ↓                     |
|    |     |     | 生食              | 250mL                   |                |                       |

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカロン錠を朝,昼食後に4mg/回

&lt;ドセタキセル&gt;

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にすること。

(1hrで滴下する場合126滴/分)

&lt;カルボプラチン&gt;

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)※Ccrは原則Jeliffé法  
アレルギー好発時期:8回目以降