

科名 婦人科-41
 対象疾患名 子宮頸がん
 プロトコール名 BEV+PTX+NGT

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ	↓	↓	↓		
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ ファモチジン デキサート注	1mg 20mg 3.3~19.8mg	30分かけて	↓				
3	点滴注	側管	パロノセロンバッグ デキサート注 ファモチジン	0.75mg 3.3~19.8mg 20mg	30分かけて	↓				
4	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓				
5	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	30分かけて		↓	↓		
6	点滴注	側管	パクリタキセル 生理食塩液	175 or 150 or 135mg/m ² 500mL	必ず3時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	↓				
7	点滴注	側管	ハイカムチン 生理食塩液	0.75mg/m ² 100mL	30分かけて	↓	↓	↓		
8	点滴注	側管	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	医師の指示通り	↓				

★1クール=21日

~MEMO~

催吐レベル2(10~30%)

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要
 アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

<アバスチン>

3レジメン以上の化学療法歴、消化管等腹腔内炎症の合併症例使用不可

創傷治癒遅延の作用により術後28日以内の投与不可

投与速度:初回90分,忍容性良好であれば60分,30分まで短縮可