

科名 婦人科
 対象疾患名 ハイリスク絨毛性腫瘍
 プロトコール名 EMA/CO

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	8	...	14
1	点滴注	メイン②-1	生食	500mL	ルートキープ残破棄可 10:00	↓							
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ デキサート	1mg 9.9mg	30分かけて イメンド服用を確認後投与 10:00~10:30	↓							
3	点滴注	側管	コスメゲン 生食	0.5mg/body 50mL	10分かけて 10:30~10:40	↓							
4	点滴注	側管	エトボシド 生食	100mg/m ² 250mL	60分かけて 10:40~11:40	↓							
5	点滴注	側管	メソトレキセート 生食	300mg/m ² 500mL	12時間かけて 11:40~23:40	↓							
6	点滴注	メイン②-2	ソルデム1 メイロン	500mL 40mL	4時間かけて 23:40~翌3:40	↓							
7	点滴注	メイン③-1	ソルデム1 メイロン	500mL 40mL	4時間かけて 3:40~7:40	↓							
8	点滴注	メイン③-2	ソルデム1 メイロン	500mL 40mL	4時間かけて 7:40~11:40	↓							
9	筋注		ロイコボリン	15mg	メソトレキセート投与開始24時間後 11:40	↓							
10	点滴注	③-3	生食	500mL	ルートキープ残破棄可 11:40	↓							
11	点滴注	側管	グラニセロンバッグ デキサート	1mg 9.9mg	30分かけて 11:40~12:10	↓							
12	点滴注	側管	コスメゲン 注射用水 生食	0.5mg/body 1.1mL 50mL	10分かけて 12:10~12:20	↓							
13	点滴注	側管	エトボシド 生食	100mg/m ² 250mL	60分かけて 12:20~13:20	↓							
14	筋注		ロイコボリン	15mg	メソトレキセート投与開始36時間後 23:30	↓							
15	筋注		ロイコボリン	15mg	メソトレキセート投与開始48時間後 11:30 内服でも可	↓							
16	筋注		ロイコボリン	15mg	メソトレキセート投与開始60時間後 23:30 内服でも可	↓							
17	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可							↓	
18	点滴注	側管	アロキシ デキサート	0.75mg 9.9mg	30分かけて							↓	
19	点滴注	側管	オンコピン 生食	1mg/m ² 50mL	全開投与							↓	
20	点滴注	側管	エンドキサン 生食	600mg/m ² 100mL	60分かけて							↓	

★1クール=14日

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

day1にイメンド125mgをグラニセロン投与の60分前に内服

day2,3の午前中にイメンド80mg内服

day2-4,day9-11にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服(8mg/day)。

day3のロイコボリンは内服でも可