

科名 婦人科  
 対象疾患名 子宮頸癌  
 プロトコル名 BEV+TP(ショートハイドレーション)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	9	7	8	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	～17:00	↓									
2	点滴注	側管	生食	50mL	30分かけて	↓									
			デキサート	6.6mg											
			ファモチジン	20mg											
3	点滴注	側管	生食	50mL	30分かけて	↓									
			ネオレスタール	10mg											
4	点滴注	側管	パクリタキセル	67.5mg/m <sup>2</sup>	12時間かけて	↓									
			生食	500mL											
5	点滴注	メイン	生食	500mL	17:00～パクリタキセル終了まで	↓									
6	点滴注	側管	パクリタキセル	67.5mg/m <sup>2</sup>	12時間かけて	↓									
			生食	500mL											
7	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残薬可	↓									
8	点滴注	側管	パロノセトロンパッグ	0.75mg	30分かけて	↓									
			アロカリス	235mg											
			デキサート	9.9mg											
9	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	60分かけて	↓									
			硫酸マグネシウム	4mL											
10	点滴注	側管	マンニトールS	150mL	15分かけて	↓									
11	点滴注	側管	シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	120分かけて	↓									
			生食	500mL											
12	点滴注	側管	アバステン	15mg/kg	医師の指示通り	↓									
			生理食塩液	100mL											
13	点滴注	側管	生食	500mL	60分かけて	↓									
14	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	60分かけて	↓									
			硫酸マグネシウム	4mL											

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

day3～5にデキサトロン錠を朝食後に4mg/回

・PTX135mg/m<sup>2</sup> + CDDP50mg/m<sup>2</sup>...triweeklyにて3～6コース

・Cr<50mL/min以上(50mL/min未満ではCrIにあわせてCDDPを1-2レベル減量して開始。

Cr>2.0投与不可)

・血液毒性(Gr3-4発熱性好中球減少症、Gr4血小板減少症)で減量を要する場合、PTXを1レベルずつ減量する。

・日常生活を害する末梢神経障害が出現した場合、PTXおよびCDDPを減量する。

・肝機能障害の場合、PTXを減量する。

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例、アルコール含有、アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回、2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

末梢静脈から投与する場合は薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

<シスプラチンショートハイドレーション法の適応条件>

PS0-1

腎機能が十分に維持されている。(血清Crが上限以下かつCr≥60mL/min)

心機能に問題がない。(心エコーEF≥60%、500mL/hの補液に耐える)

飲水指示に協力的

<シスプラチンショートハイドレーション法の観察項目>

シスプラチン投与終了までに1L程度の経口補水を患者に促す。

一方で水中毒を介した低Na血症を所持する可能性があるため過剰な飲水をしないよう患者に説明。

シスプラチン投与当日から3-5日間は尿量(又は尿回数)・体重・飲水量の記録を行う

シスプラチン投与直後から2時間の尿量(1L/2hを確保)に留意し、追加の利尿剤を検討。

投与開始～シスプラチン投与終了後2時間までの尿回数あるいは体重変化が一助となる。目安:尿回数が3回未満。体重が2kg増量など

day2以降、飲水困難であれば積極的に補液を行う。

腎機能の評価は血清Creを用いるのが一般的。特に初回サイクルは1週間以内に確認するのが望ましい。

<アバステン>

初回90分で点滴静注、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分で

行ってもよい。2回目の忍容性も良好であれば、以降30分投与もできる。

投与期間中は投与回数が増えるほど高血圧の出現頻度が高くなるため定期的に血圧を測定すること。

大きな手術(開腹手術等)後28日以内には投与しないこと。