

科名 婦人科
 対象疾患名 小細胞がん
 プロトコール名 CBDCA+VP16

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	...	8	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	↓				
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて	↓						
			デキサート	9.9mg								
3	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて			↓		↓		
			デキサート	6.6mg								
			又は									
4	点滴注	側管	パロノセトロン	0.75mg	30分かけて	↓						
			デキサート	9.9mg								
5	点滴注	側管	デキサート	6.6mg	30分かけて			↓		↓		
			生食	50mL								
6	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC5	60分かけて	↓						
			生食	250mL								
7	点滴注	側管	エトポシド	80mg/m ²	90分かけて	↓	↓	↓				
			生食	500mL	フィルター使用不可							

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降

<エトポシド>

フィルター使用不可