

科名 婦人科
 対象疾患名 平滑筋肉腫
 プロトコール名 IFM

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	・・・	28
1	点滴注	メイン5-①	生食	500mL	ルートキープ イホマイド終了まで入れきり	↓	↓	↓	↓	↓		
2	点滴注	側管①	グラニセトロン1mgバッグ デキサート	1mg 9.9mg	15分かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
3	点滴注	側管②	イホマイド 生食	1500mg/m ² 250mL	60分かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
4	点滴注	側管③	ウロミテキサン 生食	300mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイドと同時に	↓	↓	↓	↓	↓		
5	点滴注	メイン5-②	生食 メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
6	点滴注	メイン5-③	ソルデム3A メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
7	点滴注	側管④	ウロミテキサン 生食	300mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイド投与4時間後	↓	↓	↓	↓	↓		
8	点滴注	メイン5-④	ソルデム3A メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
9	点滴注	メイン5-⑤	ウロミテキサン 生食	300mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイド投与8時間後	↓	↓	↓	↓	↓		

★1クール=28日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day6～8にデキサメタゾン錠を朝、昼食後に4mg/回