

科名 婦人科
 対象疾患名
 プロトコール名 IFM+PTX

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	...	5	...	21
1	点滴注	メイン6-①	生食	500mL	ルートキープ パクリタキセル終了まで入れきり	↓						
2	点滴注	側管①	パロノセトロン デキサート ファモチジン	0.75mg 19.8mg 20mg	30分かけて	↓						
3	点滴注	側管②	ネオレスタール 生食	10mg 50mL	30分かけて	↓						
4	点滴注	側管③	パクリタキセル 生理食塩液	135mg/m ² 500mL	必ず3時間かけて	↓						
5	点滴注	メイン6-②	生食	500mL	ルートキープ イホマイド終了まで入れきり	↓						
6	点滴注	側管④	イホマイド 生食	1600mg/m ² 250mL	60分かけて	↓						
7	点滴注	側管⑤	ウロミテキサン 生食	320mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイドと同時に	↓						
8	点滴注	メイン6-③	生食 メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓						
9	点滴注	メイン6-④	ソルデム3A メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓						
10	点滴注	側管⑥	ウロミテキサン 生食	320mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイド投与4時間後	↓						
11	点滴注	メイン6-⑤	ソルデム3A メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓						
12	点滴注	メイン6-⑥	ウロミテキサン 生食	320mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイド投与8時間後	↓						
13	点滴注	メイン5-①	生食	500mL	ルートキープ イホマイド終了まで入れきり	↓	↓					
14	点滴注	側管①	生食 デキサート	50mL 6.6mg	30分かけて	↓	↓					
15	点滴注	側管②	イホマイド 生食	1600mg/m ² 250mL	60分かけて	↓	↓					
16	点滴注	側管③	ウロミテキサン 生食	320mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイドと同時に	↓	↓					
17	点滴注	メイン5-②	生食 メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓	↓					
18	点滴注	メイン5-③	ソルデム3A メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓	↓					
19	点滴注	メイン5-④	ソルデム3A メイロン	500mL 20mL	90分かけて	↓	↓					
20	点滴注	側管④	ウロミテキサン 生食	320mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイド投与4時間後	↓	↓					
21	点滴注	メイン5-⑤	ウロミテキサン 生食	320mg/m ² 50mL	15分かけて イホマイド投与8時間後	↓	↓					
22	皮下注		ジーラスタ	3.6mg						↓		

★1クール=21日

~MEMO~
 催吐レベル3(30%以上90%未満)