

科名  
対象疾患名  
プロトコール名

婦人科  
子宮体癌  
AP療法

婦人-16(b)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	～17:00	↓					
2	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	90分かけて	↓					
3	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ アロカリス デキサート注	1mg 235mg 9.9mg	30分かけて	↓					
	点滴注		アロキシバッグ アロカリス デキサート注	0.75mg 235mg 9.9mg	30分かけて						
4	点滴注	側管	ドキシソピシン注 生理食塩液	60,45mg/m2 50mL	10分以内でDIV 壊死性抗癌剤	↓					
5	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	1時間かけて	↓					
6	点滴注	側管	ラシックス注	10mg	シスプラチン投与前に	↓					
7	点滴注	側管	シスプラチン注※ 生理食塩液	50,40mg/m2 500mL	2時間かけて	↓					
8	点滴注	側管	ソルデム3A	500mL	2時間かけて	↓					
9	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	17:00～0:00	↓					
10	点滴注	側管	ソルアセトF	500mL	Rp 9 終了～0:00	↓					
11	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00～6:00		↓				
12	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00～12:00		↓				
13	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00～ 30分かけて		↓				
14	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	12:00～18:00		↓				
15	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	18:00～0:00		↓				
16	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00～6:00			↓			
17	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00～14:00			↓			
18	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00～ 30分かけて			↓			
19	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	14:00～22:00			↓			
20	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	22:00～6:00			↓			
21	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	6:00～				↓		
22	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:00～ 30分かけて				↓		

★1クール=21日

～MEMO～

- ・triweeklyにて6コースまで(ADRの総投与量を超えるため)
  - ・ADRを含む前治療歴がないこと。
  - ・放射線治療歴のあるものは、ADR初期量45mg/m2で開始する。
  - ・クレアチニンクリアランス50mL/min以上
  - ・心エコーにてLVEF50%以上
- ※シスプラチンは100mgまで