

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻-2(a)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 DOC+CDDP+フルオロウラシル

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット 硫酸マグネシウム	1000mL 1000mL 10mL 10mL	22:00~10:00 ※ アリマバッグ	↓						
2	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 3.3~13.2~16.5mg	9:00~ 30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	ネオレスタール 生理食塩液	10mg 50mL	9:30~ 30分かけて	↓						
4	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30~ 30分かけて			↓	↓	↓		
5	点滴注	側管	ドセタキセル 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	10:00~12:00	↓						
6	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	12:00~14:00	↓						
7	点滴注	メイン	フルオロウラシル 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	375mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00~22:00 ※アリマバッグ	↓						
8	点滴注	メイン	フルオロウラシル 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	375mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	22:00~10:00 ※アリマバッグ	↓						
9	点滴注	メイン	フルオロウラシル 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	750mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00~10:00 ※アリマバッグ			↓	↓	↓		
10	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	12:00~18:00	↓						

1クール=22日(day1はハイドレーション)

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

イメンドカプセルを内服する。(day2は9時30分に125mg、day3、4は午前中に80mg)