

科名 耳鼻咽喉科
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 CDDP+放射線併用(day4-7ソルアセトF)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット 硫酸マグネシウム	1000mL 1000mL 10mL 10mL	22:00~10:00 ※アリメバッグ	↓								
2	点滴注	側管①	パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 3.3~13.2~16.5mg	9:30~ 30分かけて	↓								
3	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30~10:00			↓	↓	↓				
4	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	10:00~12:00	↓								
5	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00~22:00 ※アリメバッグ	↓								
6	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00~10:00 ※アリメバッグ	↓								
7	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00~10:00 ※アリメバッグ			↓	↓					
8	点滴注	側管①	マンニトールS	300mL	12:00~14:00	↓								
9	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	3時間かけて				↓	↓	↓	↓		
10	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	3時間かけて				↓	↓	↓	↓		
11	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	3時間かけて				↓	↓	↓	↓		

★1クール=22日 (day1はハイドレーション)

~MEMO~

- ・ 催吐レベル4 (90%以上)
- ・ イメンドカプセルを内服する。(day2は9時30分に125mg、day3, 4は午前中に80mg)
- ・ 3週間ごと(21日間)3コース
- ・ CDDPによる腎機能障害発症防止のため、投与前後に十分な輸液負荷を行なう。