

科名 耳鼻咽喉科

対象疾患 頭頸部癌

プロトコール名 CDDP+放射線併用(アロカリス併用)(day4-7ソルアセトF)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット 硫酸マグネシウム	1000mL 1000mL 10mL 10mL	22:00~10:00 ※アリメバッグ	↓								
2	点滴注	側管①	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート注	0.75mg 235mg 9.9mg	9:30~ 30分かけて	↓								
3	点滴注	側管①	デキサート注 生理食塩液	3.3mg 50mL	9:30~ 30分かけて			↓						
4	点滴注	側管①	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30~ 30分かけて				↓	↓				
5	点滴注	側管①	シスプラチン注 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	10:00~12:00	↓								
6	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00~22:00 ※アリメバッグ	↓								
7	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00~10:00 ※アリメバッグ	↓								
8	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00~10:00 ※アリメバッグ			↓	↓					
9	点滴注	側管①	マンニトールS	300mL	12:00~14:00	↓								
10	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	3時間かけて				↓	↓	↓	↓		
11	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	3時間かけて				↓	↓	↓	↓		
12	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	3時間かけて				↓	↓	↓	↓		

★1クール=22日(day1はハイドレーション)

~MEMO~

- ・ 催吐レベル4(90%以上)
- ・ 3週間ごと(21日間)3コース
- ・ CDDPによる腎機能障害発症防止のため、投与前後に十分な輸液負荷を行なう。