

科名 耳鼻科 耳鼻-22  
 対象疾患名 小細胞癌  
 プロトコール名 CDDP+VP16+放射線

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	29
1	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	22時～1時	↓					
2	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	1時～4時		↓				
3	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	4時～7時			↓			
4	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	7時～10時				↓		
5	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	10時～14時					↓	
6	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	14時～18時						↓
7	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	18時～22時						
8	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	22時～2時						↓
9	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	2時～6時					↓	
10	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	6時～10時						↓
11	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	10時～13時				↓	↓	
12	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	13時～16時					↓	↓
13	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	16時～19時					↓	↓
14	点滴注	側管①	グラニセトロンバッグ デキサート	1mg 13.2mg	30分かけて 10時～10時30分			↓	↓	↓	
17	点滴注	側管①	エトポシド 生食(テルモ)	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	90分かけて 10時30分～12時 PVCフリーのルートで メイン前後フラッシュ					↓	
16	点滴注	側管①	シスプラチン 生食	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	2時間以上かけて 12時～14時					↓	
15	点滴注	側管①	マンニトールS	300mL	2時間かけて 14時～16時					↓	
18	点滴注	側管①	エトポシド 生食(テルモ)	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	90分かけて 10時30分～12時 PVCフリーのルートで					↓	↓

★1クール=29日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

イメンドカプセルを内服する。(day2は9時30分に125mg、day3, 4は午前中に80mg)

エトポシドのルートはPVCフリーを使用。

ラジエーションは14時以降