

科名 耳鼻科
 対象疾患名 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
 プロトコール名 PTX(頭頸部)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	56
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残ハキ可	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
2	点滴注	側管	デキサート注 ファモチジン 生食	6.6~19.8mg 20mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
3	点滴注	側管	ネオレスタール注 生食	10mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
4	点滴注	側管	パクリタキセル注 生食	80 or 100mg/m2 250mL	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗癌剤	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓

★1クール=56日

~MEMO~

- ・催吐レベル2(30~10%)
 - ・パクリタキセルはアルコール含有。アルコールアレルギーの確認を。
 - ・パクリタキセルはPVCフリーかつフィルター付きのものを使用。
- 禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例
- アレルギー対策:初回デキサート増量(13.2mg)
- ・初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。
 - ・パクリタキセル投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。
 - ・薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.6倍にすること。
(1hrで滴下する場合136滴/分)