

科名 耳鼻科
 対象疾患名 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
 プロトコール名 Cmab+PTX(2クール目以降)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	56
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残ハキ可	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
2	点滴注	側管	デキサート注 ファモチジン 生食	6.6~19.8mg 20mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
3	点滴注	側管	ネオレスタール注 生食	10mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
4	点滴注	側管	アービタックス 生食	250mg/m ² 250mL	医師の指示通り	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
5	点滴注	側管	パクリタキセル注 生食	80mg/m ² 250mL	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗癌剤	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓

★1クール=56日

~MEMO~

・催吐レベル2(30~10%)

<パクリタキセル>

(アレルギーに対して)

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例

アルコール含有するためアルコールアレルギー確認要

1クール目day2(パクリタキセル初回)はデキサート増量(13.2mg)

初回、2回目までは注意し、投与開始から10分はベッドサイドにいること。

(投与に関して)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.6倍にすること。(1hrで滴下する場合136滴/分)

<アービタックス>

初回投与量は400mg/m²を2時間かけて、2回目以降は250mg/m²を1時間かけて点滴静注する。

投与中はバイタルサイン等をモニタリングする。

投与前後は生食でフラッシュすること。