

科名 耳鼻科
 対象疾患名 頭頸部がん
 プロトコール名 Cmab+FP(初回)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	...	9	...	16	...	22
1	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	22:00～翌4:00	↓											
2	点滴注	側管①	5%ブドウ糖	500mL	22:00～翌4:00	↓											
3	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	4:00～10:00	↓											
4	点滴注	側管①	5%ブドウ糖	500mL	4:00～10:00	↓											
5	点滴注	メイン	生食	500mL	10:00～16:00	↓											
6	点滴注	側管①	パロノセトロンパッグ アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 9.9mg	10:30～11:00	↓											
7	点滴注	側管①	アービタックス 生食	400mg/m ² 250mL	11:00～13:00	↓											
8	点滴注	側管①	シスプラチン 生食	100mg/m ² 250mL	14:00～16:00	↓											
9	点滴注	側管②	マンニトールS	300mL	14:00～16:00	↓											
10	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	16:00～22:00	↓											
11	点滴注	側管①	5FU 5%ブドウ糖	250mg/m ² 500mL	16:00～22:00	↓											
12	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	22:00～翌4:00	↓											
13	点滴注	側管①	5FU 5%ブドウ糖	500mg/m ² 500mL	22:00～翌10:00	↓											
14	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	4:00～10:00	↓											
15	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	10:00～16:00	↓											
16	点滴注	側管①	5FU 生食	250mg/m ² 500mL	10:00～16:00	↓											
17	点滴注	側管②	デキサート 生食	6.6mg 50mL	10:00～10:30	↓											
18	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	16:00～22:00	↓	↓	↓									
19	点滴注	メイン	生食	500mL	22:00～翌4:00	↓	↓	↓									
20	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	4:00～10:00	↓	↓	↓									
21	点滴注	メイン	生食	500mL	10:00～16:00	↓	↓	↓									
22	点滴注	側管①	5FU 生食	1000mg/m ² 250mL	16:00～翌16:00	↓	↓	↓									
23	点滴注	側管②	デキサート 生食	6.6mg 50mL	10:00～10:30	↓	↓										
24	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破薬可								↓		↓		
25	点滴注	側管①	デキサート クロールトリメトン 生食	6.6mg 10mg 50mL	30分かけて								↓		↓		
26	点滴注	側管①	アービタックス 生食	250mg/m ² 250mL	医師の指示通り								↓		↓		

★1クール＝22日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

<アービタックス>

アービタックスの初回投与量は400mg/m²を2時間かけて、2回目以降は250mg/m²を1時間かけて点滴静注する。

アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。

アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。

アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。