

科名 耳鼻科

対象疾患名 頭頸部癌

プロトコール名 Cmam+CBDCA+FU(初回)(アロカリス併用)

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 21 |
|-----------------|-----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | 生食 | 500mL | ルートキープ 残破棄可 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | パロノセトロン アロカリス デキサート ネオレスタール | 0.75mg 235mg 4.95mg 10mg | 30分かけて | ↓ | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | アービタックス 生食 | 400mg/m ² 250mL | 2時間かけて | ↓ | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴注 | 側管 | 生食 デキサート ネオレスタール | 50mL 6.6mg 10mg | 30分かけて | | | | | | ↓ | | ↓ | | |
| 5 | 点滴注 | 側管 | アービタックス 生食 | 250mg/m ² 250mL | 2時間かけて | | | | | | ↓ | | ↓ | | |
| 1時間休薬ルートキープにて休薬 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 点滴注 | 側管 | カルボプラチン 生食 | AUC5 250mL | 1時間かけて | ↓ | | | | | | | | | |
| 7 | 点滴注 | 側管 | フルオロウラシル 生食 | 1000mg/m ² 500mL | 24時間かけて | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | |

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデキサート錠を朝,昼食後に4mg/回

6コースまで

<アービタックス>

アービタックスの初回投与量は400mg/m²を2時間かけて、2回目以降は250mg/m²を1時間かけて点滴静注する。

アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。

アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。

アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)コッククロフト式

アレルギー好発時期:8回目以降