

科名 耳鼻科
 対象疾患名 頭頸部癌
 プロトコール名 Cmab+DBDCA+FU(2回目以降)(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	↓	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	パロノセトロン アロカリス デキサート ネオレスタール	0.75mg 235mg 4.95mg 10mg	30分かけて	↓									
3	点滴注	側管	生食 デキサート ネオレスタール	50mL 6.6mg 10mg	30分かけて						↓		↓		
4	点滴注	側管	アービタックス 生食	250mg/m ² 250mL	1時間かけて	↓					↓		↓		
1時間休薬ルートキープにて休薬															
5	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC5 250mL	1時間かけて	↓									
6	点滴注	側管	フルオロウラシル 生食	1000mg/m ² 500mL	24時間かけて	↓	↓	↓	↓						

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデキサート錠を朝,昼食後に4mg/回

6コースまで

<アービタックス>

アービタックスの初回投与量は400mg/m²を2時間かけて、2回目以降は250mg/m²を1時間かけて点滴静注する。

アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。

アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。

アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)コッククロフト式
 アレルギー好発時期:8回目以降