

科名 耳鼻科
 対象疾患名 頭頸部癌
 プロトコール名 キイトルーダ+CBDCA+FU

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	↓	↓						
2	点滴注	側管	パロノセトロン デキサート	0.75mg 9.9mg	30分かけて	↓									
3	点滴注	側管	キイトルーダ 生食	200mg 100mL	30分かけて	↓									
4	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC5 250mL	1時間かけて	↓									
5	点滴注	側管	フルオウラシル 生食	1000mg/m ² 500mL	24時間かけて	↓	↓	↓	↓						

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～3にデキサメタゾン錠を朝、昼食後に4mg/回

6コースまで

<キイトルーダ>

本剤作用機序により、過度の免疫反応による副作用が現れることがある。発現した事象に応じた専門医と連携すること。

特に注意を要する副作用:間質性肺疾患、大腸炎、重度の下痢、肝炎、神経障害、副腎障害、重度の皮膚障害

infusion reaction、重症筋無力症、筋炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、腎障害、脳炎、静脈血栓症

インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン)を使用し、投与前後に生食でフラッシュする。

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)コッククロフト式

アレルギー好発時期:8回目以降