

科名 呼吸器内科
 対象疾患名 局所進行性非小細胞肺がん
 プロトコール名 PTX+CBDCA+RT

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	56
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓												
			デキサート	9.9mg														
			ファモチジン	20mg														
			又は															
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて													
			デキサート	9.9mg														
			ファモチジン	20mg														
4	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて			↓		↓		↓		↓		↓		↓
			デキサート	6.6mg														
			ファモチジン	20mg														
			又は															
5	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて													
			デキサート	6.6mg														
			ファモチジン	20mg														
6	点滴注	側管	ネオレスタール	10mg	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
			生食	50mL														
7	点滴注	側管	パクリタキセル	40mg/m ²	60分かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
			生食	250mL														
8	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC2	60分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
			生食	250mL														

★1クール=56日

～MEMO～

催吐レベル3(30%～90%)

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC2=2x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降