

科名 呼吸器内科
 対象疾患名 非小細胞肺癌(非扁平上皮がん)
 プロトコール名 PEM+CBDCA+BEV

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓						
			デキサート	9.9mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて							
			デキサート	9.9mg								
4	点滴注	側管	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分かけて	↓						
			生食	100mL								
5	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC6	1時間かけて	↓						
			生食	250mL								
6	点滴注	側管	ベバシズマブ	15mg/kg	医師の指示通り	↓						
			生食	100mL								

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%～90%)

day2～3にデキサメタゾン錠を朝,昼食後に4mg/回

<ペメトレキセド>

NSAIDsと併用注意

副作用予防のため必ず葉酸とビタミンB12を組み合わせる。

葉酸: フォリアミン0.5mg/dayはペメトレキセド投与7日前～最終投与後22日目まで毎日投与。

ビタミンB12: メチコバル注500μgを2Aペメトレキセド投与7日前～最終投与後22日目まで9週毎(3コースごと)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC6=6x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降

<ベバシズマブ>

3レジメン以上の化学療法歴、消化管等腹腔内炎症の合併症例使用不可

創傷治癒遅延の作用により術後28日以内の投与不可

投与速度:初回90分,忍容性良好であれば60分,30分まで短縮可