

科名 呼吸器内科
 対象疾患名 進展型小細胞肺癌
 プロトコール名 イミフィンジ+CBDCA+VP16

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	↓		
2	点滴注	側管	パロノセトロン アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 4.95mg	30分かけて	↓				
3	点滴注	側管	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて		↓	↓		
4	点滴注	側管	イミフィンジ 生食	1500mg 250mL	60分かけて 室温保存では調製後4時間以内に投与開始	↓				
5	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC5~6 250mL	60分かけて	↓				
6	点滴注	側管	エトポシド 生食	80~100mg/m ² 500mL	90分かけて	↓	↓	↓		

★1クール=21日

~MEMO~

催吐レベル3(30%以上90%未満)

~~day1イメンド125mg、day2,3にイメンド80mgを服用する。~~

4コースまで

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC6=6x(Ccr+25)

アレルギー-好発時期:8回目以降

<エトポシド>

フィルター使用不可

<イミフィンジ>

体重30kg以下の場合は1回投与量は20mg/kg(体重)とする。