

科名	外科	外23
対象疾患	乳癌	
プロトコール名	weekly PTX	

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	コメント	1	・・・	8	・・・	15	・・・	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	30分かけて	↓		↓		↓		
		側管	ファモチジン注	20mg								
			生理食塩液	50mL								
3	点滴注	側管	ネオレスタール注	10mg	30分かけて	↓		↓		↓		
			生理食塩液	50mL								
4	点滴注	側管	パクリタキセル	80mg/m ²	60分かけて 壊死性抗癌剤 専用ルート	↓		↓		↓		
			生理食塩液	250mL	JY-PF340P52使 用							

★1クール=28日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

末梢静脈から投与する場合は薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)