

科名 外科 外36
 対象疾患 乳癌
 プロトコール名 HER+VNR(初回)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ……	8 ……	15 ……	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ	↓	↓	↓	
			(250mL使用)						
2	点滴注	側管	トラスツズマブ注	4mg/kg	90分	↓			
			注射用水	7.2mL					
			生理食塩液	250mL					
2	点滴注	側管	トラスツズマブ注	2mg/kg	初回90分。以降忍容性があれば30分。 ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2 回目60分。以降忍容性あれば30分。		↓	↓	
			注射用水	7.2mL					
			生理食塩液	250mL					
3	点滴注	側管	ロゼウス注	25mg/m ²	5~10分で DIV	↓	↓	(↓)	
			生理食塩液	50mL					

★1クール=21日

~MEMO~

催吐レベル2(10%以上30%未満)

<ロゼウス>

3投1休/コース or 2投2休/コース

ロゼウスは全開投与し、終了後メインの生食を250mL全開で落とす。

<トラスツズマブ>

初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg。初回90分で忍容性があれば2回目以降30分。ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。

禁忌: アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

最終投与から6週以上経過した場合は初回投与量(4mg/kg)より再開する。