

科名 外科 外39(b)

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 BEV+FOLFIRI(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	14
1	CVポート	メイン3-①	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓			
2	CVポート	側管②	グラニセトンバッグ アロカリス デキサート 又は	1mg 235mg 4.95mg	30分かけて	↓			
3	CVポート	側管②	パロノセトンバッグ アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 4.95mg	30分かけて				
4	CVポート	側管③	ベバシズマブ注 生理食塩水	5mg/kg 100mL	医師の指示通り	↓			
5	CVポート	メイン3-②	レボホリナート注 生理食塩液	200mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
6	CVポート	側管④	カンプト注 生理食塩液	150 or 180mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
7	CVポート	側管⑤	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	全開で	↓			
8	CVポート	メイン3-③	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² mL※	46時間持続静注 バクスターインフューザーSV2.5	→			

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

1クール=14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

【注1】 ベバシズマブは生食で希釈。(薬効が落ちる)

ベバシズマブは初回90分で点滴静注、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分で

行ってもよい。2回目の忍容性も良好であれば、以降30分投与もできる。

大きな手術(開腹手術等)後28日以内には投与しないこと。

【注2】 外31にベバシズマブを追加