

科名 外科 外43(b)

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 Cmam+FOLFIRI(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1		8	...	14
1	CVポート	メイン	生理食塩水	500mL	ルートキープ	↓		↓		
2	CVポート	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート ネオレスタール	0.75mg 235mg 6.6mg 10mg	30分かけて	↓				
3	CVポート	側管	生理食塩水 デキサート注 ネオレスタール	50mL 6.6mg 10mg	30分かけて			↓		
4	CVポート	側管	アービタックス 生理食塩液	250mg/m ² 250mL	医師の指示通り	↓		↓		
5-①	CVポート	メイン	レボホリナート 生理食塩水	200mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓				
5-②	CVポート	側管	カンプト(CPT11) 生理食塩水	150 or 180mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓				
6	CVポート	側管	フルオロウラシル 生理食塩水	400mg/m ² 50mL	全開で	↓				
7	CVポート	メイン	フルオロウラシル 生理食塩水	2400mg/m ² mL※	46時間持続静注 バクスターインフューザーSV2.5	↓				

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

★1クール＝14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

- ・アービタックスの初回投与量は400mg/m²を2時間かけて、2回目以降は250mg/m²を1時間かけて点滴静注する。
- ・アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。
 - ・アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。
 - ・アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。
 - ・アービタックス使用にあたっては、EGFR陽性を確認する検査を実施すること。