

科名	外科	外-46(a)
対象疾患名	乳がん	
プロトコール名	AC	

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ	↓						
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓						
			デキサート	13.2～16.5mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて							
			デキサート	13.2～16.5mg								
4	点滴注	側管	エンドキサン	600mg/m ²	30分かけて	↓						
			生食	100mL								
5	点滴注	側管	ドキソルビシン	60mg/m ²	15分かけて	↓						
			生食	50mL	壊死性抗がん剤							

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

day2-4にデカドロン1回2mgまたは4mgを1日2回朝、昼食後に内服する。(4mg/dayまたは8mg/day)

・術後補助療法の場合は、3週ごと4サイクル繰り返した後パクリタキセルを3週毎4サイクル投与する。

・進行再発乳癌の場合は、3週毎繰り返し行うが、ドキソルビシンの総投与量は500mg/m²以下とする。