

科名 外科

対象疾患名 結腸・直腸癌(切除不能または再発)

プロトコール名 IRIS大腸癌(TS-1+CPT11)

| Rp  | 形態  | ルート  | 薬剤名                          | 投与量                  | コメント                | 1 | … | 15 | … | 28 |
|-----|-----|------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|----|---|----|
| 1   | 点滴注 | メイン  | 生理食塩液                        | 250mL                | ルートキープ              | ↓ |   | ↓  |   |    |
| 2   | 点滴注 | 側管   | パロノセトロンバッグ                   | 0.75mg               | 30分かけて              | ↓ |   | ↓  |   |    |
| 3   | 点滴注 | 側管   | デキサート注                       | 6.6mg                | 30分かけて              | ↓ |   | ↓  |   |    |
|     |     |      | 生理食塩液                        | 100mL                |                     |   |   |    |   |    |
| 4   | 点滴注 | 側管   | カンプト注(CPT-11)                | 100mg/m <sup>2</sup> | 90分以上かけて            | ↓ |   | ↓  |   |    |
|     |     |      | 生理食塩液                        | 500mL                |                     |   |   |    |   |    |
| (5) | 経口  | TS-1 | 1回 40mg/m <sup>2</sup> を1日2回 |                      | d1～d14投与、d15～d28は休薬 |   |   |    |   |    |

★1クール=28日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

TS-1は 14日間投与、14日間休薬

・TS-1は 体表面積(BSA)<1.25m<sup>2</sup>:40mg/回1.25m<sup>2</sup>≤BSA<1.5m<sup>2</sup>:50mg/回BSA≥1.5m<sup>2</sup>:60mg/回