

科名 外科  
 対象疾患名 術前・術後乳がん  
 プロトコール名 weeklyPTX12週連続投与

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	22	...	28
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残ハキ可	↓		↓		↓		↓		↓
2	点滴注	側管	デキサート注 ファモチジン注 生食	6.6~19.8mg 20mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓
3	点滴注	側管	ネオレスタール注 生食	10mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓
4	点滴注	側管	パクリタキセル注 生食	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗癌剤	↓		↓		↓		↓		↓

★1クール=28日 12週連続投与

～MEMO～

・催吐レベル2(30～10%)

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

薬剤特徴(末梢静脈投与時):1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)