

科名 外科 外—50(a)

対象疾患 大腸癌

プロトコール名 XELOX(大腸癌)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	14	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ デキサート注 ファモチジン ネオレスタール注 又は	1mg 9.9mg 20mg 10mg	30分かけて	↓				
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ デキサート ファモチジン ネオレスタール	0.75mg 9.9mg 20mg 10mg	30分かけて					
4	点滴注	側管	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 250mL又は500mL	2時間かけて ルート毎変更	↓				

内服 ゼローダ 1回1000mg/m²を1日2回 d1～d14投与、d15～d21は休薬

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

- ・ オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖液で希釈。(薬効がおちる。)
- ・ オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)
- ・ デキサートは6.6～19.8mgで選択可。