

科名 外科 外—50(b)

対象疾患 大腸癌

プロトコール名 XELOX(大腸癌)(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	14	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓				
			アロカリス	235mg						
			デキサート注	4.95mg						
			ファモチジン注	20mg						
			ネオレスタール注	10mg						
			又は							
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて					
			アロカリス	235mg						
			デキサート	4.95mg						
			ファモチジン注	20mg						
			ネオレスタール	10mg						
4	点滴注	側管	オキサリプラチン注	130mg/m ²	2時間かけて	↓				
			5%ブドウ糖液	250mL又は500mL	ルート毎変更					

内服 ゼローダ 1回1000mg/m²を1日2回 d1～d14投与、d15～d21は休薬

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

- ・ オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖液で希釈。(薬効がおちる。)
- ・ オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)
- ・ デキサートは6.6～19.8mgで選択可。